

# SOJA IN SONČNICE



Certis Belchim SI d.o.o.  
Motnica 7, 1236 Trzin  
[www.certisbelchim.si](http://www.certisbelchim.si)



**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER



## VARSTVO PRED PLEVELI V SOJI

Osnovna zaščita pred pleveli se opravi pred vznikom soje. Ker posevek od samega začetka nima konkurence s pleveli, je mladostni razvoj soje boljši in neprimerno hitrejši od posevkov, ki jih škropimo po vzniku (škropljenje širokolistnih plevelov po vzniku močno upočasni rast in razvoj mladih rastlin soje).

**Proman** je temelj herbicidnih kombinacij za zatiranje plevelov v soji. Zaradi izredne učinkovitosti na najpomembnejše pleveli v soji, največkrat korekcija ni potrebna. V primeru potrebnih korekcij pa so te ravno zaradi visokega učinka kombinacij enostavnejše.

Škropljenje je potrebno opraviti pred vznikom, najboljše do 3 dni po setvi soje:

**PROMAN** 1,5-2 L/ha + **CLOMATE** 0,2-0,25 L/ha

Vse kombinacije so brez omejitev na VVO!



Dravsko polje 2024

## VARSTVO PRED PLEVELI V SONČNICAH

Za varstvo pred pleveli v sončnicah po vzniku skorajda ni na voljo herbicidov (razen foliarnih graminicidov - npr. FUSILADE MAX), zato je potrebno takoj po setvi uporabiti ustrezne rešitve, da se zagotovi neoviran razvoj posevka od samega začetka.

Proman High Voltage program je preverjena in učinkovita rešitev za zatiranje plevelov v sončnicah.


Osnovno škropljenje pred vznikom, najboljše do 4 dni po setvi sončnic:

**PROMAN** 1,5-2,5 L/ha + **CHANON** 2-2,5 L/ha

Korekcija ozkolistnih plevelov in trav po vzniku sončnic:

**FUSILADE MAX** 1-2 L/ha

Vse kombinacije so brez omejitev na VVO!



Vzhodna Slovenija 2024

**MULTI  
FLEX**  
herbicide

*High Voltage*



Selektivni talni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v soji, krompirju, oljni ogrščici, grahu, fižolu, korenju in oljnih bučah.

Čas škropljenja: takoj po setvi pred vznikom gojenih rastlin  
Odmerek v soji: 0,25 L/ha



Selektivni talno-kontaktni herbicid za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega plevela v sončnicah, krompirju, čičeriki, fižolu, grahu in leči.

Čas škropljenja: takoj po setvi pred vznikom gojenih rastlin  
Odmerek v soji in sončnicah: do 2,5 L/ha



Selektivni foliarni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v sončnicah in zelo številnih ostalih širokolistnih kulturah.

Čas škropljenja: po vzniku gojenih rastlin in ozkolistnih plevelov  
Odmerek v sončnicah: 1-2 L/ha



## TEMELJ VSAKEGA ZANESLJIVEGA PROGRAMA VARSTVA PRED PLEVELI V SOJI IN SONČNICAH!

PROMAN deluje na zelo širok spekter gospodarsko škodljivih širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Uporablja se lahko samostojno ali v kombinacijah. V naših priporočilih ga vedno priporočamo kot osnovni herbicid, partnerja pa mu dodamo glede na kulturo, kjer zatiramo plevel.

PROMAN deluje med vsemi talnimi herbicidi najboljše na ambrozijo!



kontrola



Proman

**AKTIVNA SNOV**  
metobromuron 500 g/L

**NAČIN DELOVANJA**  
talno, delno preko lista

**FORMULACIJA SREDSTVA**  
koncentrirana suspenzija (SC)

**REGISTRIRANE KULTURE**  
soja, sončnice, krompir, bob

### POMEMBNO:

Škropljenje s PROMANOM je potrebno opraviti pred vznikom posevka (največ 4 dni po setvi)!

Dejavnik tveganja za fitotoksičnost je lahko povečan na lahkih tleh, ki poleg malo gline vsebujejo tudi malo organske snovi (<1,5 %).

V takih tleh je odmerke potrebno prilagoditi, kot sledi

- < 15% gline: ne škropite s PROMANOM
- 15-25% gline: odmerek PROMANA največ 1,5 L/ha

	<15% gline	gline 15-25%	>25% gline
<b>SOJA</b>	ne škropiti s Promanom	največ 1,5 L/ha	uporaba v skladu s priporočili
<b>SONČNICE</b>	največ 2 L/ha	uporaba v posebej navedenih odmerkih iz te tabele	uporaba v skladu s priporočili



High Voltage

**HI-WETT****UNIVERZALNO PROFESIONALNO POMOŽNO SREDSTVO ZA VSE VRSTE FFS IN FOLIARNIH GNOJIL****5 POMEMBNIH FUNKCIJ HI -WETTA**

- zmanjševanje zanašanja („drifta“)
- super omočevanje
- zadrževanje in lepljenje na listno površino
- uravnotežen vnos v rastlino
- močnejše pozicioniranje talnih herbicidov v tleh



brez

dodan HI-WETT

PRIPOROČEN ODMEREK: 0,1-0,15 L/ha

**AZO-SPEED FOLIARNA PREHRANA Z DUŠIKOM**

AZO- SPEED vsebuje dušik iz uree in iz uree formaldehida, magnezij, žveplo in lignosulfonate. Odlikuje ga hitra dostopnost in razpoložljivost dušika (2 obliki) na daljši rok. AZO-SPEED ima visoko kompatibilnost s fitofarmaceutskimi sredstvi (izboljšanje učinkovitosti FFS, manjše število škropljenj, ni omejitev mešanja).

UPORABA: V SONČNICAH: 10-15 L/ha (v fazi 5-6 parov listov)

**BORAKTIV FOLIARNA PREHRANA Z BOROM, MOLIBDENOM, MANGANOM IN DUŠIKOM**

BORAKTIV je po sestavi edinstven proizvod na trgu, ki omogoča istočasno oskrbo z B, N, Mo in Mg. Uporaba omogoča povečano stimulacijo rasti in cvetenja ter posledično višje pridelke. Dovoljena uporaba v ekološki proizvodnji.

UPORABA: V SONČNICAH: 3 L/ha (2x v fazi 5-6 parov listov)  
V SOJI: 3 L/ha (1- 2X v fazi od 2-3 listov do cvetenja)

Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno. Pred uporabo vselej preberite navodila za uporabo in informacije o sredstvu. Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

**STROKOVNA PODPORA:**

Mitja Törnár  
Urban Simončič  
Anže Grmovšek  
Mitja Brežnik  
mag. Anton Gošnik

Štajerska in vzhodna Slovenija  
južna in JV Slovenija  
zahodna in osrednja Slovenija  
marketing in razvoj  
vodja CB SI

031 239 720  
031 459 500  
031 476 776  
051 354 767  
051 262 209

mitja.tornar@certisbelchim.com  
urban.simoncic@certisbelchim.com  
anze.grmovsek@certisbelchim.com  
mitja.breznik@certisbelchim.com  
anton.gosnik@certisbelchim.com

